

Виагра - инструкция по применению

Общие сведения

Данный препарат начинает свою работу через 15 минут после применения. В мужском половом органе расширяются сосуды, а также повышается кровообращение, за счет чего член приходит в рабочее положение.

Нужно заметить, что половой акт с дженериком виагрой, длится значительно дольше, что несомненно позволяет в полной мере насладиться приятными ощущениями.

Сколько может длиться половой акт?

Действующее вещество – Силденафил, которое и отвечает за повышенную работу полового органа, функционирует на протяжении 8 часов, ну а половой акт может длиться от 30 минут и до 3 часов, тут все зависит от активности мужчины.

Правила приёма препарата

Чтобы лекарство обладало усиленным эффектом, стоит придерживаться простых правил:

- Применять за 15 – 20 мин, до полового контакта;
- Ограничить употребление алкогольных напитков;
- Включить в рацион здоровую пищу (фрукты, овощи, рыба, диетическое мясо);
- Отдавать предпочтение сладостям и исключать высоко содержащие халестерин продукты.

При эректильной дисфункции:

Пациенты, имеющие частые половые контакты (более, чем два раза в неделю), должны принимать дженерик один раз в день в одно и то же время не более 5 мг. При проявлении индивидуальной непереносимости дозу необходимо снизить в 2 раза.

Мужчинам, имеющим половые контакты значительно реже (в течение недели – менее двух раз), рекомендуется принимать Сиалис один раз в день по 20 мг.

Доза может быть откорректирована в зависимости от тяжести степени почечной недостаточности. Если почечная недостаточность лёгкая или средняя, суточная доза не нуждается в корректировке. Если степень тяжёлая, устанавливать дозу должен лечащий врач.

Совместимость с другими препаратами

Принимать Сиалис совместно с другими препаратами не рекомендовано, поскольку ещё не все комбинации изучены специалистами.

Показания к применению

Препарат используется при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и эректильной дисфункции. Дженерик предназначен для орального приёма внутрь.

Противопоказания

Запрещён: лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста; при непереносимости лактозы или дефиците лактазы; при индивидуальной непереносимости к компонентам препарата; при употреблении лекарственных средств, содержащих любые нитраты; при наличии заболеваний сердца и сосудов; при потере способности видеть из-за неартериальной передней ишемической невропатии зрительного нерва; при одновременном приёме с лекарственными средствами, предназначенными для лечения дисфункции; при приёме доксазозина.

Принимать с осторожностью: в сочетании с гипотензивными препаратами; при тяжёлой почечной недостаточности; в сочетании с мощными ингибиторами; в сочетании с альфа-адреноблокаторами; при наличии анатомической деформации мужского полового органа (угловое искривление, болезнь Пейрони и т. д.); при наличии предрасположенности к приапизму (множественная миелома, лейкемия).

Побочные эффекты

К побочным эффектам, возникающим редко, относят: транзиторную амнезию; припухлости век; эпилептические припадки; нарушение зрения; мигрени; инъекирование сосудов склеры; транзиторные ишемические атаки; неартериальную переднюю ишемическую оптическую невропатию; обмороки; отёк лица; внезапную потерю слуха; приапизм; инфаркт миокарда; длительную эрекцию; желудочковые нарушения ритма; эксфолиативный дерматит; нестабильную стенокардию; синдром Стивенса-Джонса; крапивницу и носовые кровотечения.

Среди нечасто возникающих побочных явлений называют: боли в груди; гиперчувствительность; повышенную потливость; нечёткое зрительное восприятие; сыпь; неприятные ощущения в глазном яблоке; боль в животе; учащение сердцебиения; снижение или повышение артериального давления; одышку и заложенность носа.

К наиболее частым побочным явлениям относятся: головные боли; головокружения; миалгию; диспепсию и боли в спине.

Некоторые побочные эффекты (мигрени, отёк лица, обмороки) были выявлены в ходе исследований. Данная группа побочных явлений не наблюдалась при проведении клинических исследований до поступления препарата в продажу. Внезапные потери слуха были отмечены ещё во время проведения опытов у испытуемых, принимавших ингибиторы.

Кроме этого, побочные явления были замечены у пациентов, имевших заболевания сердца или факторы риска. Однако в последнем случае специалистам не удалось определить, чем эти явления были вызваны. Среди вероятных причин называют сексуальное возбуждение, приём тадалафила, а также комбинацию обоих факторов.

Диагностика эректильной дисфункции необходима для выявления основной причины проблемы. Для пациентов, страдающих некоторыми видами сердечных заболеваний, противопоказана половая активность. Именно поэтому лечение мужчин препаратом Сиалис в таком случае недопустимо, поскольку лекарственное средство повышает сексуальную активность.

При возникновении продолжительной эрекции (от четырёх часов и более) пациент должен обратиться за врачебной помощью. Об этом необходимо заранее проинформировать мужчину. В том случае, если помощь не будет оказана своевременно, пациента ожидают серьёзные повреждения полового органа, что приведёт к необратимой импотенции.

Особенно осторожными следует быть пациентам, имеющим высокое артериальное давление, поскольку Сиалис может оказывать сосудорасширяющее действие. При назначении препарата лечащему врачу необходимо позаботиться о том, чтобы назначенная доза не навредила пациенту.

Сроки и условия хранения

Сиалис должен храниться в недоступности для детей, при температуре, не превышающей +30°. Срок хранения препарата – не более трёх лет.